



信實公寓大廈管理維護(股)公司

信實物業管理顧問股份有限公司

信實保全股份有限公司

病媒防治施作計畫書

病媒防治業名稱：信實公寓大廈管理維護(股)公司

許可執照字號：竹縣環藥病媒字第 04-019 號

地址：新竹縣竹北市和平街201號

電話：(03)553-5778 傳真：(03)553-5779

客戶名稱：溪海國民小學		病媒防治公司 簽名或蓋章		負責人簽名或蓋章 	
地址：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號				病媒防治業專業技術人員簽名或蓋章 	
客戶代表簽名：					
客戶名稱及代號(序號)：CT1D-003					
施作序號：OTDS-108-10-04					
專業技術人員姓名：陳玉如		施藥人員姓名：鄭鑫嘉、陳文雄			
施作地點：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號			施作日期：108 年 10 月 11 日 16:00		
施作範圍描述：校園之教室及走廊。			施作面積：1200 坪		
防治對象： <input checked="" type="checkbox"/> 蟑螂 <input type="checkbox"/> 老鼠 <input type="checkbox"/> 跳蚤 <input checked="" type="checkbox"/> 蚊子 <input type="checkbox"/> 蒼蠅 <input type="checkbox"/> 白蟻 <input type="checkbox"/> 子孓 <input checked="" type="checkbox"/> 螞蟻 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <u>小黑蚊</u>					
施用藥劑名稱	稀釋前藥劑使用量 (稀釋前藥劑濃度)	劑型	許可證字號	使用區域	
亞寧	300 毫升(100 %W/W) 每 c.c 稀釋 150 倍	乳劑	環署衛製字 第 1891 號	同施作範圍	
施作方法：					
一、施作對象為：蟑螂、蚊子、螞蟻及小黑蚊。					
二、依據環保署環境用藥施作守則規定，將藥劑依規定稀釋倍數搭配手壓式噴霧機工具及低容量機 (ULV) 噴霧機工具施作殘效及空間噴灑。					
三、殘效噴灑：將藥劑成帶狀噴灑於牆面、牆角、門框、戶內陰暗、潮溼、通風不良等害蟲可能停歇之處，以由上而下、由內而外的方式做全面式噴灑，待蟲害接觸即有致死效果。					
四、空間噴灑：將藥劑噴灑於空中使能飄浮並均勻分佈，噴頭以大約 45 度角向下空間噴灑，讓藥劑緩緩飄浮空間，以撲殺飛舞之蚊蟲害。					
五、預估有效期為 25-35 天(視實際狀況而定)。					
施作時及施作後應注意事項：					
一、藥物噴灑區域須於施工前半小時將該區域之偵煙感應器、自動灑水器及空調系統暫時關閉，於施藥後 3.5 小時方可開啓，進入施藥區前，請先打開門窗通風，以策安全。					
二、藥物噴灑時，須配合實施人員及動物管制，如有要事需進入施藥區時，需配帶活性碳口罩。					
三、中毒之蟑螂軀體應立即清除(因蟑螂之卵鞘無法殺死)。					
四、請加強日常環境清潔維護，每日清除垃圾、維持地面清潔乾燥、排水溝暢通，方為消除害蟲孳生源之最佳方法。					
預防中毒及急救方法：					
一、中毒症狀為：皮膚刺激性、嘔吐、頭痛、暈眩、抽搐及其他過敏反應等症狀。					
二、不同暴露途徑之急救方法：					
吸入：移至新鮮空氣處，若不適症狀仍未減，則立即送醫診治。					
食入：請勿自行催吐，應立即送醫由醫師診治處理。					
皮膚接觸：立即以清水沖洗 15 分鐘，若有仍覺不適立即就醫診治。					
眼睛接觸：立即以乾淨的清水沖洗，若有仍覺不適立即就醫診治。					
三、如有緊急狀況發生，可打電話至榮民總醫院臨床毒物科尋求解答，榮民總醫院臨床毒物科專線電話：(02) 2875-7525。					



信實公寓大廈管理維護(股)公司

信實物業管理顧問股份有限公司

信實保全股份有限公司

病媒防治施作計畫書

病媒防治業名稱：信實公寓大廈管理維護(股)公司

地址：新竹縣竹北市和平街201號

許可執照字號：竹縣環藥病媒字第 04-019 號

電話：(03) 553-5778 傳真：(03)553-5779

客戶名稱：溪海國民小學	病媒防治公司 簽名或蓋章		負責人簽名或蓋章
地址：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號			
客戶代表簽名：			病媒防治業專業技術人員簽名或蓋章
客戶名稱及代號(序號)：CT1D-003			
施作序號：OTDS-108-10-05			

專業技術人員姓名：陳玉如 施藥人員姓名：鄭鑫嘉

施作地點：桃園市大園區溪海里 11 鄰和平西路一段 420 號 施作日期：108 年 10 月 23 日 13:00

施作範圍描述：校園之教室及走廊。 施作面積：240 坪

防治對象： 蟑螂 老鼠 跳蚤 蚊子 蒼蠅 白蟻 孑孓 螞蟻 其它__

施用藥劑名稱	稀釋前藥劑使用量 (稀釋前藥劑濃度)	劑型	許可證字號	使用區域
新奧除	60 公克(0.0375 %W/W) 約 2~5 公克	餌劑	環署衛製字 第 1696 號	同施作範圍

施作方法：

- 一、施作對象為：螞蟻類。
- 二、依據環保署環境用藥施作守則規定，將藥劑依規定置於螞蟻聚、覓食、躲藏、棲息、繁殖處。取約 2-5 公克直接置於螞蟻群出沒處。
- 三、本劑因係屬緩效致死作用，故螞蟻群會受吸引持續出及並將誘餌帶回巢穴餵食幼蟻及蟻后。
- 四、螞蟻類取食後，平均死亡日數為 6.8(5-8)天(視實際狀況及螞蟻類取食總量而定)。

施作時及施作後應注意事項：

- 一、將食物收藏妥當及垃圾加蓋，斷絕食物來源，可增加誘殺及顯著之撲滅效果。
- 二、設置餌劑時應事先告知風險及注意事項，並請公告周知。
- 三、請加強日常環境清潔維護，每日清除垃圾、維持室內外環境衛生，方為防止鼠類之最佳方法。

預防中毒及急救方法：

- 一、使用本劑時應戴手套，避免與皮膚、眼睛、衣物接觸。
- 二、中毒症狀為噁心、反胃、嘔吐、腹瀉等症狀。
- 三、本劑應避免口部接觸，使用本劑後應立即以肥皂清洗。
- 四、不同暴露途徑之急救方法：
 - 吸入：若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。若無呼吸，立即進行人工呼吸及送醫。
 - 皮膚接觸：用肥皂及水徹底清洗暴露區域，如果刺激或疼痛感持續，則必須請醫生檢視患部。
 - 眼睛接觸：暴露的眼睛必須用大量微溫水沖洗至少 15 分鐘，如果患者依舊感到刺激感、疼痛、患部腫脹、淚水分泌增加或畏光，則最好送醫治療。
 - 食入：會產生反胃症狀，應立即持本品標示送醫治療，若有治療上的問題請洽詢台北榮民總醫院，毒藥物諮詢中心 TEL：02-28717121
- 五、如有緊急狀況發生，可打電話至榮民總醫院臨床毒物科尋求解答，榮民總醫院臨床毒物科專線電話：(02)2875-7525。

註：本計畫書可依電子檔自行調整列寬

S-024-I-A