

小兒頭部外傷〈HEAD INJURY〉

二、較輕微頭部外傷

頭上鼓起一個腫塊，雖然小孩起先有點昏眩或目瞪口呆，但意識仍保持清醒，在幾分鐘之內，小孩或許無法受撫慰而安靜下來，可能會吐一、兩次（兩小時內），在驚動之餘，他也許想睡，甚至小睡一會兒，但容易被喚醒，兩眼的瞳孔都沒有擴大，嘔吐不久也消失了！在幾個小時內，除了頭上的那個如鵝蛋般的腫塊外，小孩又完全恢復了正常。

有時出現頭皮內鬆軟的血腫，切忌抽取，通常在數週內可自行吸收。若有頭蓋骨骨折，九成以上在兩三個月內癒合，少數會有“成長性”骨折的現象。

三、嚴重的頭部外傷

當顱內壓升高的症狀開始出現時，小孩會逐漸喪失警覺性，瞳孔大小不一，射出性嘔吐等危險跡象，也會跟著出現在小孩。過了驚動期仍然昏睡，而且不易喚醒，一邊的瞳孔可能擴大。嘔吐通常呈噴射狀，並一再的出現。有些顱內出血的問題在受傷後幾個月才會出現，所謂的硬腦膜下血腫，可能會導致慢性的頭痛或人格改變。

*頭部外傷後：靜養仔細觀察是最重要的。

* 頭部外傷的居家照顧方法

在瘀傷部位冰敷，可減少腫脹的程度，小孩頭部外傷常會出現如鵝蛋般的腫塊，但腫塊大小並不代表受傷的嚴重程度。

觀察期是具有決定性的重要性，如有顱內出血，在受傷後72小時或更長時間內，會使顱內壓力逐漸升高而出現各種症狀。因此在受傷後24小時內，應每隔兩個鐘頭檢查病人一次，第二天4小時檢查一次，第三天每8小時檢查一次。

* 注意下列情況：

1. 警覺性：漸增的昏睡，不太有反應，異常的深睡可能是昏迷的前兆，病人若不易被叫醒，表示病情嚴重，應立即送醫。
2. 瞳孔大小不一：顱內壓升高所引起，是嚴重的病徵。
3. 射出性的嘔吐：頭部外傷後，可能發生強力的噴射狀嘔吐，如嘔吐一再發生，應立即就醫。

煩請家長配合此說明書，一起留意關心孩子情況 感謝您！