

H7N9流感－國內外疫情概況

中國大陸、全國及本市H7N9流感疫情

項目 區域	H7N9流感病例數(截至102/4/25 18:00)				
	通報人數	確診人數	死亡人數	檢驗中	排除
中國大陸	-	109	23	-	-
全國	133	1	0	6	126
高雄市	13	0	0	1	12


中國大陸疫情概況

省別	上海市	安徽省	江蘇省	浙江省	北京市	河南省	山東省	總人數/備註
確診病例	33例	4例	24例	42例	1例	4例	1例	109例
死亡病例	12例	1例	4例	6例	0例	0例	0例	23例

死亡個案流行病學線索：2名為禽畜接觸者、1名為廚師工作、農民3名、退休8名、其餘9名不知職業別，共23名。

中國大陸H7N9流感病例分布 (截至102.4.25 13:00止)

H7N9確定病例：109例；死亡病例：23例



中央因應H7N9流感整備架構

四大策略			
及早偵測	傳染阻絕手段	流感抗病毒藥劑	流感疫苗
<ul style="list-style-type: none"> • 境外阻絕 	<ul style="list-style-type: none"> • 邊境管制 • 社區防疫 • 醫療體系保全 • 個人與家庭防護 	<ul style="list-style-type: none"> • 儲備量之評估與維持 • 多元儲備 • 屆期藥物管理 • 藥物普及性提升 • 使用規劃 	<ul style="list-style-type: none"> • 目前無疫苗 • 與 WHO 及疫苗廠保持聯繫 • 已建立疫苗接種優先順序

五道防線				
境外阻絕	邊境管制	社區防疫	醫療體系保全	個人與家庭防護
<ul style="list-style-type: none"> • 國際疫情掌握 • 入境旅客健康監視 • 國內相關監視 • 病毒資訊獲取 	<ul style="list-style-type: none"> • 健康資訊及旅遊警示 • 入/出境管制 	<ul style="list-style-type: none"> • 擴大社交距離 	<ul style="list-style-type: none"> • 病患隔離收治 • 個人防護裝備整備 	<ul style="list-style-type: none"> • 衛生行為促進

◎ 因應台灣出現首例境外移入H7N9流感確定病例，指揮中心召開第六次會議，江揆親臨視察並瞭解各部會防疫進度



預防H7N9流感

如不慎接觸禽鳥及其分泌物請用肥皂洗手

危『雞』總動員 防禽護健康！

認識H7N9流感


H7N9流感病毒屬於禽流感病毒的一種，主要感染野生鳥類和家禽（如雞、鴨、鵝等），為禽類傳染病，大多只在禽鳥間傳播，很少感染人類，但病毒基因若在感染物種間持續變異，演化成可以有效人傳人之病毒，即有可能造成人類流感大流行。

H7N9流感病毒傳播途徑

主要是因為接觸感染的禽鳥、或是牠們的糞便以及被糞便汙染的物體，由吸入或接觸口、眼、鼻黏膜而感染。

2 吸入傳染

1 接觸傳染



預防H7N9流感的方法

勤.洗手

經常使用肥皂洗雙手
(使用乾洗手液可預防H7N9的傳播)

戴.口.罩

咳嗽時戴口罩
避免傳染給別人

掩.口.鼻

打噴嚏時要用衛生紙
或手帕遮住口鼻

生病不外出

生病要聽醫生
並盡量在家休息

遠離禽鳥

不要到疫情流行地區的
農畜場、農場及鳥類市場
也不要購買禽鳥
不要購買和屠宰不明的禽鳥

要吃熟食

雞、鴨、鵝肉及海鮮
要完全煮熟後才吃



高雄市政府衛生局 關心您

高雄市動物保護處 07-7462368
衛生防疫諮詢專線 07-2514113

宣導廣告

人類感染H7N9流感病毒有哪些症狀？

1. 初期徵兆包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、流鼻水、肌肉酸痛、嘔吐、食慾不振及腹瀉等，症狀與季節性流感相似。
2. 後期則可能發展為高燒、肺炎、呼吸衰竭、呼吸窘迫、多重器官衰竭等，嚴重者甚至造成死亡。

民眾就醫流程圖



註1、本市50間地區級以上具有公費流感抗病毒藥劑合約醫院請至高雄市政府衛生局全球資訊網 H7N9流感防治專區 <http://www.khd.kcg.gov.tw> 查詢

註2、本市應變暨指定隔離醫院：署立旗山醫院、民生醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、阮綜合醫院、小港醫院、義大醫院、健仁醫院、高醫大附設中和紀念醫院、聯合醫院

★防疫小叮嚀★

民眾如出現高燒(38°C以上)、咳嗽等類流感症狀且曾至H7N9流感病例發生地區，請務必戴口罩盡速至本市50間地區級以上具有公費流感抗病毒藥劑合約醫院並主動告知醫師相關病史、工作史、禽畜接觸史及旅遊史，掌握治療黃金時間。



高雄市政府衛生局 關心您

高雄市動物保護處 07-7462368
衛生防疫諮詢專線 07-2514113

宣導廣告

環境消毒撇步

注意事項：

- 共同生活空間：校車、合作社、宿舍、廁所、教室等應每日確實消毒。
- 對於常接觸物體表面，如：門把、水龍頭、水漕、馬桶圈、洗臉臺、浴缸扶把、電話、櫃檯、桌椅、餐桌、樓梯扶把、電梯按鈕、電燈開關、床墊罩、制服、床單及床、玩具、遊樂設施、寢具及書本做擦拭消毒。
- 清洗完畢的物體可移至戶外，接受陽光照射。



簡易消毒水泡製方法

- 建議可用濃度5-6%的一般家用含氯漂白水20c. c. 加5公升清水泡成200ppm的消毒水，針對常接觸的地方，如門把、桌椅、餐桌、樓梯扶手、玩具或遊樂設施等擦拭消毒後，過30分鐘再用清水擦拭，可減少刺鼻味。



乾洗手液製作

95%酒精300c. c+蒸餾水或煮沸的開水100c. c
=75%酒精性乾洗手液





+



95%酒精300c. c

蒸餾水或煮沸的開水100c. c

防範流感，布口罩也OK!

種類	功能	使用時機	注意事項
 <p>棉布口罩</p>	<p>對於$6\mu\text{m}$以上微粒及飛沫仍有80%以上的阻隔效果</p> <p>纖維結構的孔隙較大，呼吸阻抗較小，透氣性佳</p>	<p>病患在無外科口罩時，以棉質口罩替代亦可有效減少咳出的飛沫量</p>	<p>適合各年齡層及一般健康民眾進出人潮擁擠或空氣不流通之場所時，減少被感染的風險</p> <p>清洗後可重複使用，經濟又環保，家長可為孩子準備2、3個，每日替換</p>
 <p>外科口罩(醫用面罩)</p>	<p>對於$6\mu\text{m}$微粒有90%以上的阻隔效果</p> <p>三層質料構成：外層可防潑濺；中層有過濾作用；內層可吸收濕氣</p>	<p>醫護人員佩戴可避免其飛沫影響病人</p> <p>有呼吸道症狀的病患佩戴可減少咳出的飛沫微粒散逸</p>	<p>因呼吸阻抗較大，不建議給幼童佩戴</p> <p>有髒污、潮濕即應更換</p>
 <p>N95口罩</p>	<p>若口罩面體能與臉部良好密合，對於最難過濾的$0.3\mu\text{m}$大小粉塵顆粒，仍有95%以上的阻擋效果</p> <p>過濾的功能主要是靠中間的溶噴不織布</p>	<p>醫護人員暴露於高風險之醫療環境下使用。</p> <p>勞工於有粉塵危害之職場環境下使用。</p>	<p>呼吸阻抗較高，且佩戴前須經密合度測試及訓練，不適合一般民眾或有呼吸道症狀的病患長時間佩戴</p> <p>有髒污、破損、潮濕或變形即應更換</p>

布口罩對於6微米以上微粒及飛沫已具有80%以上的阻隔效果，戴棉布口罩也可以提供相當程度的保護力，棉布口罩可以重複使用，經濟、實惠。



請至本局網站H7N9流感防治專區
或行政院衛生署疾病管制局網站查詢
<http://khd.kcg.gov.tw/>