

## 琉球國中春暉專案嚼食檳榔危害認知（題庫）

- [ ] 1、長期嚼食檳榔可能引發「咬肌肥大症」，而使上下唇萎縮，妨礙經口攝食並影響顏面外觀。
- [ ] 2、吃檳榔的婦女對胎兒造成的危險性則為常人的2.3倍。
- [ ] 3、牙周病或牙齒鬆動是嚼食口香糖的人經常有的現象。
- [ ] 4、吃檳榔過量會出現許多中毒症狀，輕則興奮、眼神呆滯、全身發抖，重則導致幻聽、自我膨脹、被迫狂想等急性精神病。
- [ ] 5、一般所謂的檳榔，其嚼塊是以檳榔果為主要成份，並以荖葉，荖花和石灰作為配料。
- [ ] 6、口腔癌的發生率和死亡率皆已進入台灣十大癌症之列。
- [ ] 7、兒童福利法、少年福利法、明文規定禁止兒童、少年嚼食檳榔。
- [ ] 8、男性嚼食檳榔罹患口腔癌，名列為台灣十大癌症的第5位。
- [ ] 9、口腔檳榔癌的症狀，口腔黏膜增加、口內腫塊不癒的潰瘍，且不容易察覺。
- [ ] 10、台灣每年死於口腔癌超過1000人，其中90%以上是女性，以每年的新發病的個案近2000人，且持續增加。
- [ ] 11、口腔黏膜下纖維化的病人，口腔黏膜會有燒灼感、潰瘍、變白，最後造成張口及吞嚥困難。其中有部份會變成口腔癌患者。
- [ ] 12、因嚼食檳榔所誘發的口腔癌，稱為「口腔檳榔癌」。
- [ ] 13、嚼食檳榔的時間愈長久，罹患口腔癌的機率愈小。
- [ ] 14、容易引起口腔癌、喉癌、咽癌和食道癌的元兇是嚼食甘蔗。
- [ ] 15、依據「食品衛生管理法」，檳榔屬於有害的食品。
- [ ] 16、嚼食檳榔有另一不雅的特徵〈1〉黑齒〈2〉鐵齒所造成的重要影響，並不只是外表難看，有更多的食物殘渣堆積形成牙菌斑增加，而是表示牙齒已失去了寶貴的功能。
- [ ] 17、檳榔果俗稱菁仔，其中〈1〉檳榔素〈2〉檳榔鹼〈3〉以上皆是，這兩種成分經國內外研究結果顯示，具有致癌性。
- [ ] 18、檳榔的相關問題會影響〈1〉國民健康〈2〉環境衛生〈3〉水土保持〈4〉以上皆是等方面造成很大的危害。
- [ ] 19、嚼食檳榔會增加罹患口腔癌風險，國內口腔癌死亡率二十年內成長〈1〉8倍〈2〉9倍〈3〉10倍。
- [ ] 20、根據「少年福利法」，賣檳榔給〈1〉18歲〈2〉19歲〈3〉20歲以下的少年或小孩是違法行為。

## 琉球國中春暉專案嚼食檳榔危害認知（答案）

- 〔○〕1、長期嚼食檳榔可能引發「咬肌肥大症」，而使上下唇萎縮，妨礙經口攝食並影響顏面外觀。
- 〔○〕2、吃檳榔的婦女對胎兒造成的危險性則為常人的2.3倍。
- 〔×〕3、牙周病或牙齒鬆動是嚼食口香糖的人經常有的現象。
  
- 〔○〕4、吃檳榔過量會出現許多中毒症狀，輕則興奮、眼神呆滯、全身發抖，重則導致幻聽、自我膨脹、被迫狂想等急性精神病。
- 〔○〕5、一般所謂的檳榔，其嚼塊是以檳榔果為主要成份，並以荖葉，荖花和石灰作為配料。
- 〔○〕6、口腔癌的發生率和死亡率皆已進入台灣十大癌症之列。
- 〔○〕7、兒童福利法、少年福利法、明文規定禁止兒童、少年嚼食檳榔。
- 〔○〕8、男性嚼食檳榔罹患口腔癌，名列為台灣十大癌症的第5位。
- 〔○〕9、口腔檳榔癌的症狀，口腔黏膜增加、口內腫塊不癒的潰瘍，且不容易察覺。
- 〔×〕10、台灣每年死於口腔癌超過1000人，其中90%以上是女性，以每年的新發病的個案近2000人，且持續增加。
- 〔○〕11、口腔黏膜下纖維化的病人，口腔黏膜會有燒灼感、潰瘍、變白，最後造成張口及吞嚥困難。其中有部份會變成口腔癌患者。
- 〔○〕12、因嚼食檳榔所誘發的口腔癌，稱為「口腔檳榔癌」。
- 〔×〕13、嚼食檳榔的時間愈長久，罹患口腔癌的機率愈小。
- 〔×〕14、容易引起口腔癌、喉癌、咽癌和食道癌的元兇是嚼食甘蔗。
- 〔○〕15、依據「食品衛生管理法」，檳榔屬於有害的食品。
- 〔1〕16、嚼食檳榔有另一不雅的特徵〈1〉黑齒〈2〉鐵齒所造成的重要影響，並不只是外表難看，有更多的食物殘渣堆積形成牙菌斑增加，而是表示牙齒已失去了寶貴的功能。
- 〔3〕17、檳榔果俗稱菁仔，其中〈1〉檳榔素〈2〉檳榔鹼〈3〉以上皆是，這兩種成分經國內外研究結果顯示，具有致癌性。
  
- 〔4〕18、檳榔的相關問題會影響〈1〉國民健康〈2〉環境衛生〈3〉水土保持〈4〉以上皆是等方面造成很大的危害。
- 〔1〕19、嚼食檳榔會增加罹患口腔癌風險，國內口腔癌死亡率二十年內成長〈1〉8倍〈2〉9倍〈3〉10倍。
- 〔1〕20、根據「少年福利法」，賣檳榔給〈1〉18歲〈2〉19歲〈3〉20歲以下的少年或小孩是違法行為。

## 94 學年度琉球國中春暉專案嚼食檳榔危害認知測驗

班級：      座號：      姓名：\_\_\_\_\_      得分： \_\_\_\_\_

**\*每題 10 分，共 100 分**

- ( ) 1、容易引起口腔癌、喉癌、咽癌和食道癌的元兇是嚼食甘蔗。
- ( ) 2、吃檳榔的婦女對胎兒造成的危險性則為常人的 2.3 倍。
- ( ) 3、兒童福利法、少年福利法、明文規定禁止兒童、少年嚼食檳榔。
- ( ) 4、口腔癌的發生率和死亡率皆已進入台灣十大癌症之列。
- ( ) 5、長期嚼食檳榔可能引發「咬肌肥大症」，而使上下唇萎縮，妨礙經口攝食並影響顏面外觀。
- ( ) 6、嚼食檳榔有另一不雅的特徵〈 1 〉黑齒〈 2 〉鐵齒  
所造成的重要影響，並不只是外表難看，有更多的食物殘渣堆積形成牙菌斑增加，而是表示牙齒已失去了寶貴的功能。
- ( ) 7、檳榔果俗稱菁仔，其中〈 1 〉檳榔素〈 2 〉檳榔鹼〈 3 〉以上皆是，這兩種成分經國內外研究結果顯示，具有致癌性。
- ( ) 8、檳榔的相關問題會影響〈 1 〉國民健康〈 2 〉環境衛生〈 3 〉水土保持〈 4 〉以上皆是等方面    造成很大的危害。
- ( ) 9、嚼食檳榔會增加罹患口腔癌風險，國內口腔癌死亡率二十年內成長  
〈 1 〉 8 倍〈 2 〉 9 倍〈 3 〉 10 倍。
- ( ) 10、根據「少年福利法」，賣檳榔給  
〈 1 〉 18 歲〈 2 〉 19 歲〈 3 〉 20 歲    以下的少年或小孩是違法行為。