

琉球國中春暉專案愛滋病防治教育認知測驗（題庫）

- () 1、接受愛滋病毒染者之器官移植，有可能染愛滋病。
- () 2、使用牙刷、刮鬍刀會造成出血，因此與他人共有機會感染愛滋病。
- () 3、若皮膚沒有損傷，就算愛滋病毒沾上了公車環、門窗、公共廁所等也不會被感染。
- () 4、叮過愛滋病患者的蚊蟲，會將愛滋病毒傳染給他人。
- () 5、為推行防疫工作，各機關得對外公開感染愛滋病者的資料。
- () 6、染愛滋病毒而發病後，愈早接受治療效果可能更好。
- () 7、與愛滋病毒的感染者或患者共同生活、沒有發生性行為，並不容易感染愛滋病。
- () 8、愛滋病的預防方法是要有忠實可靠的性伴侶，並正確全程使用保險套，避免性交易或性服務之消費。
- () 9、拔牙、針灸、穿耳洞、臉部保養時，若能遵守器械消毒的程序，是可以杜絕愛滋病的傳染。
- () 10、較早開始性行為及從事性交易容易感染愛滋病。
- () 11、愛滋病感染者除醫療機構需提供良好的醫療照護外，一般人應學去接納不幸的愛滋病患。
- () 12、愛滋病毒很怕熱，也很怕消毒液，因此即使在游泳池或公共浴池洗澡時，病毒隨著血液從傷口流入水中，病毒也會夭折，因此不會被傳染。
- () 13、衛生署自 1997 年四月開始免費提供藥物，每位感染者及患者都可以在指定醫院取得這些藥物。
- () 14、在處理愛滋病毒感染者及患者任何沾血或膿液的污物時，應特別小心。
- () 15、愛滋病毒感染後約 2 至 6 星期會出現感冒樣的原發性感染症狀。

二、選擇題 每題 5 分

- () 1、下列何者為非：愛滋病診斷標準為
 - (1)口腔或皮膚潰瘍(2)出現某些特定的伺機性感染、神經系統病症或腫瘤
 - (3)CD4 淋巴球數少於 200 個/毫升(4)HIV 的檢驗抗體呈陽性反應。
- () 2、一般而言，空窗期約是愛滋病毒感染後(1)6-12 週(2)6-12 年(3)6 至 12 月(4)6-12 小時。
- () 3、愛滋病快速傳染的原因可能是(1)一種新的病毒進捲一沒有抵抗力的族群中(2)如同一般性病，性行為是主要愛滋病毒的傳播途徑(3)以上皆是
- () 4、下列何者為非：感染愛滋病毒的高危險行為有
 - (1)肛交(2)固定性伴侶(3)感染性病(4)共用針頭
- () 5、小孩子感染愛滋病毒的徑有
 - (1)經產道垂直感染(2)經由哺乳傳染(3)輸入污染的血液製品(4)以上皆是。

琉球國中春暉專案愛滋病防治教育認知測驗（答案）

一、是非題每題 5 分

- (O)1、接受愛滋病毒染者之器官移植，有可能染愛滋病。
- (O)2、使用牙刷、刮鬍刀會造成出血，因此與他人共用有機會感染愛滋病。
- (O)3、若皮膚沒有損傷，就算愛滋病毒沾上了公車環、門窗、公共廁所等也不會被感染。
- (x)4、叮過愛滋病患者的蚊蟲，會將愛滋病毒傳染給他人。
- (x)5、為推行防疫工作，各機關得對外公開感染愛滋病者的資料。
- (O)6、染愛滋病毒而發病後，愈早接受治療效果可能更好。
- (O)7、與愛滋病毒的感染者或患者共同生活、沒有發生性行為，並不容易感染愛滋病。
- (O)8、愛滋病的預防方法是要有忠實可靠的性伴侶，並正確全程使用保險套，避免性交易或性服務之消費。
- (O)9、拔牙、針灸、穿耳洞、臉部保養時，若能遵守器械消毒的程序，是可以杜絕愛滋病的傳染。
- (O)10、較早開始性行為及從事性交易容易感染愛滋病。
- (O)11、愛滋病感染者除醫療機構需提供良好的醫療照護外，一般人應學去接納不幸的愛滋病患。
- (O)12、愛滋病毒很怕熱，也很怕消毒液，因此即使在游泳池或公共浴池洗澡時，病毒隨著血液從傷口流入水中，病毒也會夭折，因此不會被傳染。
- (O)13、衛生署自 1997 年四月開始免費提供藥物，每位感染者及患者都可以在指定醫院取得這些藥物。
- (O)14、在處理愛滋病毒感染者及患者任何沾血或膿液的污物時，應特別小心。
- (O)15、愛滋病毒感染後約 2 至 6 星期會出現感冒樣的原發性感染症狀。

二、選擇題 每題 5 分

- (1)1、下列何者為非：愛滋病診斷標準為
 - (1)口腔或皮膚潰瘍(2)出現某些特定的伺機性感染、神經系統病症或腫瘤
 - (3)CD4 淋巴球數少於 200 個/毫升(4)HIV 的檢驗抗體呈陽性反應。
- (1)2、一般而言，空窗期約是愛滋病毒感染後(1)6-12 週(2)6-12 年(3)6 至 12 月(4)6-12 小時。
- (3)3、愛滋病快速傳染的原因可能是(1)一種新的病毒進捲一沒有抵抗力的族群中(2)如同一般性病，性行為是主要愛滋病毒的傳播途徑(3)以上皆是
- (2)4、下列何者為非：感染愛滋病毒的高危險行為有
 - (1)肛交(2)固定性伴侶(3)感染性病(4)共用針頭
- (4)5、小孩子感染愛滋病毒的徑有(1)經產道垂直感染(2)經由哺乳傳染
 - (3)輸入污染的血液製品(4)以上皆是。

94 學年度琉球國中春暉專案愛滋病防治教育認知測驗

班級： 座號： 姓名：_____ 得分： _____

***每題 10 分，共 100 分**

- () 1、叮過愛滋病患者的蚊蟲，會將愛滋病毒傳染給他人。
- () 2、使用牙刷、刮鬍刀會造成出血，因此與他人共用有機會感染愛滋病。
- () 3、若皮膚沒有損傷，就算愛滋病毒沾上了公車環、門窗、公共廁所等也不會被感染。
- () 4、染愛滋病毒而發病後，愈早接受治療效果可能更好。
- () 5、為推行防疫工作，各機關得對外公開感染愛滋病者的資料。
- () 6、下列何者為非：愛滋病診斷標準為
 - (1)口腔或皮膚潰瘍(2)出現某些特定的伺機性感染、神經系統病症或腫瘤
 - (3)CD4 淋巴球數少於 200 個/毫升(4)HIV 的檢驗抗體呈陽性反應。
- () 7、一般而言，空窗期約是愛滋病毒感染後
 - (1)6-12 週(2)6-12 年(3)6 至 12 月(4)6-12 小時。
- () 8、愛滋病快速傳染的原因可能是
 - (1)一種新的病毒進捲一沒有抵抗力的族群中
 - (2)如同一般性病，性行為是主要愛滋病毒的傳播途徑(3)以上皆是
- () 9、下列何者為非：感染愛滋病毒的高危險行為有
 - (1)肛交(2)固定性伴侶(3)感染性病(4)共用針頭
- () 10、小孩子感染愛滋病毒的徑有
 - (1)經產道垂直感染(2)經由哺乳傳染(3)輸入污染的血液製品(4)以上皆是。